

HRĂNIREA PREMATURILOR ȘI COPIILOR BOLNAVI



RISEinFAMILY

Bebelușii pot fi **alăptați de îndată** ce sunt suficient de puternici.




Când bebelușii nu sunt suficient de puternici mama își **poate exprima laptele** și alimenta copilul cu acesta în diferite moduri.



În timpul îngrijirii kangaroo să apropii copilul de sân când **acesta este treaz**.



Progresul alimentației orale poate fi ajutată prin stimulare.




HRĂNIREA CU SONDA

Se folosește un tub subțire care va intra din nas sau gură în stomacul bebelușului.



HRĂNIRE CU DEGETUL ȘI SERINGA

Se introduce vârful unui deget curat care stimulează suțiuinea la bebeluș.



HRĂNIREA CU CANA

Cana va atinge buza inferioară a bebelușului care va sorbi laptele din cană.



HRĂNIREA CU STICLA

Bebelușul va fi ținut în poziție semișezândă .Apăsați vârful tetinei de buza inferioară.



HRĂNIREA CU SERINGA

Se plasează seringă în colțul gurii (nu în gură) fără a se injecta lapte.



RELACTAȚIA

Sucțiuinea de la sân și dintr-un mic recipient simultan va ajuta la producerea laptelui în cazul prematurilor care nu au forță de a suga.

